

身近に生えている植物

がい らい しょく ぶつ
実は **外来植物** ですよ！

外来植物とは・・・

人間の活動によって、海外や国内のほかの地域から持ち込まれた植物のことです。外来植物の一部は元からいる在来植物のすみかを奪い、生物の生態系に多大な悪影響を与えている植物があります。一度持ち込まれた外来植物を根絶することは極めて困難です。



所沢市イメージマスコット


トコロん

外来植物 による被害を拡げないために…


外来種被害予防3原則

外来種を取り扱う際は、以下の3つを守ることが原則です！


『入れない！』



『捨てない！』



『拡げない！』



特に、「**特定外来生物**」に指定されている外来植物は、**飼育、栽培、保管及び運搬、輸入、野外に放つ、植える、種をまく行為が法令で禁止されています！**

みんなでルールを守って、在来植物の生態系を守りましょう！

【問合せ先】

所沢市環境クリーン部みどり自然課

TEL：04-2998-9373

FAX：04-2998-9195

E-mail：a9373@city.tokorozawa.lg.jp

所沢市HPはこちら





特定
外来生物

オオキンケイギク

キク科
多年草

- ・北アメリカ原産
- ・河川敷や道路脇、荒地などに大群生を作る。
- ・葉はへら状で両面に粗い毛がある。
- ・頭花は径約6cm、舌状花は橙黄色で先に齒状のきざみがある。
- ・草丈は30～70cm、花期は5～7月。



©環境省

特定
外来生物

アレチウリ

ウリ科
1年草

- ・北アメリカ原産
- ・河川敷や荒地に多い。つる性でまきひげが絡まりながら伸びる。
- ・葉は円心状で柄がある。
- ・花は黄白色径1cmほどで総状に咲く。
- ・果実は金平糖のような形状。
- ・茎は長さ数m～十数m、花期は8～9月。



重点対策
外来種

オオブタクサ

キク科
1年草

- ・北アメリカ原産。
- ・茎は直立し多毛、多岐し大きな株になる。葉は長さ幅ともに20～30cmになり長い柄がある。
- ・河川敷や荒地などに大群生をつくる。
- ・ブタクサとともに花粉症の原因。
- ・草丈は100～300cm、花期は8～9月。



重点対策
外来種

ハナニラ

ヒガンバナ科
多年草

- ・南アメリカ原産
- ・ニラのおいがする。
- ・球根から肉質の線形葉が伸び、その間から花茎を出し先端に径4cmほどの花を付ける。
- ・花色は白から淡紫色。
- ・草丈10～20cmで、花期は3～4月。



©中部地方環境事務所

重点対策
外来種

キショウブ

アヤメ科
多年草

- ・ヨーロッパ～西アジア原産
- ・繁殖力が旺盛で、各地で野生化。
- ・湖沼、河川、水路等で生息する。
- ・花は鮮やかな黄色、花被片は3枚。
- ・黄色だけでなく淡黄色や八重咲もある。
- ・草丈50～120cm、花期は4～6月。



©生物多様性センター

重点対策
外来種

コマツヨイグサ

アカバナ科
1年草

- ・北アメリカ原産
- ・全体に粗い毛があり、葉は様々な形状がある。
- ・花弁は4枚で黄色。花は径2~3cm。
- ・茎は地上を這い、しばしば地面にマット状に広がる。
- ・草丈は20~60cm、花期は6~9月。



©近畿地方環境事務所

重点対策
外来種

セイヨウタンポポ

キク科
多年草

- ・ヨーロッパ原産
- ・頭花は径3.5~5cm。
- ・総苞外片がつぼみの時から反り返っているのが特徴（在来種は反り返らない）。
- ・舌状花も在来タンポポより多い。
- ・果実は褐色。
- ・草丈は15~45cm、花期は3~9月。



©松本市HP

重点対策
外来種

ニワウルシ

ニガキ科
落葉高木

- ・中国原産の落葉高木。別名シンジュ。
- ・ウルシ科ではなくかぶれない。
- ・葉は長さ40~60cmの奇数羽状複葉を互生。
- ・花は枝の先に30cmほどの円錐花序を出し、緑白色の5弁花を付ける。
- ・樹高は最大2.5m程度、花期は6月。



©生物多様性センター

重点対策
外来種

マルバルコウ

ヒルガオ科
1年草

- ・北アメリカ原産
- ・つる性、左巻きで物に絡まる。
- ・葉は卵型で先が尖り、基部はハート形。
- ・花はロート型で朱色、径1.5~1.8cmで上から見ると五角形。
- ・茎は長さ数m、花期は7~10月。



©生物多様性センター

重点対策
外来種

マメアサガオ

ヒルガオ科
1年草

- ・北アメリカ原産
- ・つる性、葉は先が尖った長卵形から心形。花は径1.5cmほどと小さく白色か淡紫色、浅い星形の五角形。
- ・種子は4個で肥厚する。
- ・茎は長さ数mで、花期は7~9月。



重点対策
外来種

セイタカアワダチソウ

キク科
多年草

- ・北アメリカ原産
- ・空き地や河川敷、休耕地に群生する。
- ・花以外は枝が出ない。
- ・全体に短毛が密生し、ざらつく。
- ・花色は濃黄、花序は円錐形で高さ10～50cm。
- ・草丈は100～250cm、花期は10～11月。



©九州地方環境事務所

その他
総合対策
外来種

タカサゴユリ

ユリ科
多年草

- ・台湾原産
- ・開花までの期間が短く種子から半年で開花する。
- ・茎の先端に長さ15cm、径13cmほどのラッパ状の花を単独あるいは房状に付ける。花弁は6枚、花の内側は白色。
- ・草丈は70～150cmで、花期は7～8月。



その他
総合対策
外来種

ヒメツルバ

タデ科
多年草

- ・ヒマラヤ・インド原産
- ・乾燥に強く丈夫でグランドカバーとして用いられていたものが野生化。
- ・茎は赤褐色で基部から分岐し地表を這って広がり長さ50cmほどになる。
- ・茎の先端に1cm程度の花序を付ける。
- ・花色は淡紅紫色、花期は周年。



その他
総合対策
外来種

アメリカオニアザミ

キク科
1～2年草

- ・ヨーロッパ原産
- ・根生葉は羽状に広がりロゼットとなる。
- ・全体に鋭く硬いトゲをもつ。
- 素手で触るのは危険！**
- 駆除の時は厚手の手袋を使用！**
- ・花は薄紅紫色で径3～4cm。
- ・草丈は50～150cm、花期は6～9月



©生物多様性センター

その他
総合対策
外来種

ナガバギシギシ

タデ科
多年草

- ・ヨーロッパ原産
- ・下部の葉は、長い柄があり長楕円形、縁は波打つ。
- ・上の葉ほど小さくなり、柄が短く、上部では苞葉となる。果実を取り巻く内花被片は広卵形、中央にこぶ状の突起。
- ・草丈は40～150cmで、花期は6～8月。



©農林水産省

その他
総合対策
外来種

セイバンモロコシ

イネ科
多年草

- ・ヨーロッパ地中海地域原産
- ・東北以南の道端、堤防、樹園に多い。
- ・茎は太く大株になる。
- ・葉の長さ20~60cm、幅1~2cm、無毛で葉のへりはざらつかない。
- ・花序は15~50cmで紫褐色。
- ・草丈は50~200cm、花期は7~10月。



一般
外来種

ユウゲシヨウ

アカバナ科
多年草

- ・北アメリカ南部原産
- ・市街地や農道に多い。
- ・茎は叢生したときに群落をつくる。
- ・葉は互生、長さ3~5cm。
- ・茎の上部に径1~1.5cmの淡紅色の花をつける。花弁は4枚。
- ・草丈は20~40cm、花期は5~9月。



一般
外来種

アメリカフウロ

フウロソウ科
1年草

- ・北アメリカ原産
- ・全体に白い毛が生え、茎はよく分岐する。葉は長い柄をもつ。
- ・葉の縁は紫色を帯びる。
- ・葉腋に径約8mmの淡紅色の5弁花を数個付ける。
- ・草丈は10~40cm、花期は5~6月。




一般
外来種

シロツメクサ・ムラサキツメ

マメ科
多年草

- ・ヨーロッパ原産
- ・シロツメクサは一般にクローバーと呼ばれる。
- ・葉は小葉3枚からなるが4枚以上のものもある。葉面に斑紋があるものが多い。
- ・花が集まった球状の花序を付ける。
- ・花期はどちらも5~8月。



一般
外来種

ナガミヒナゲシ

ケシ科
1年草

- ・ヨーロッパ地中海沿岸原産
- ・根生葉はロゼットを形成する。
- ・花茎の先端に径3~6cmのオレンジ色の花を単生する。
- ・花弁は4枚。
- ・草丈は20~60cmで花期は4~5月。
- ・夏に大量の種子を産出する。



一般
外来種

ヒメオドリコソウ

シソ科
2年草

- ・ヨーロッパ原産
- ・茎は四角で毛がある。
- ・葉は三角卵形状で鈍い鋸歯がり、花期には紫色になる。
- ・上部の葉の脇に長さ1cm程度の淡紅色の唇形花をつける。
- ・草丈は10~30cmで、花期は4~5月。



一般
外来種

オオイヌノフグリ

オオバコ科
多年草

- ・ヨーロッパ原産
- ・葉は下部は対生、上部は互生。
- ・楕円形で不揃いの鋸歯がある。
- ・長さ1~2cmの花柄の先に径1cm程度のコバルト色の花を付ける。
- ・果実は幅の広いハート形。
- ・草丈は15~30cm、花期は3~5月。



一般
外来種

オツタチカタバミ

カタバミ科
多年草

- ・北アメリカ原産
- ・カタバミに似ているが、カタバミの茎は地表を這うのに対し茎が立ち上がる。
- ・茎はカタバミより太く節間が短い。
- ・草丈は10~30cm、花期は4~10月。



一般
外来種

ヨウシュヤマゴボウ

ヤマゴボウ科
多年草

- ・北アメリカ原産
- ・茎は太く丸みを帯び、人の背丈を超えることもある。
- ・花序には長い柄があり垂れ下がる。
- ・果実は径8mmの球状で黒褐色に熟す。
- ・**有毒植物**
- ・草丈は100~200cm、花期は6~9月。




一般
外来種

ハルジオン

キク科
多年草

- ・北アメリカ原産
- ・茎は中空、全体に柔らかい毛がある。
- ・頭花は径2~2.5cm。
- ・つぼみの時は花序全体がうなだれる。
- ・草丈は50~130cm、花期は5~7月。



一般
外来種

ノボロギク

キク科
1年草

- ・ヨーロッパ原産
- ・湿り気のある畑地で強害雑草。
- ・茎は紫褐色、葉は互生し、不規則な羽状に裂け、基部は広がり茎を抱く。
- ・頭花は黄色、筒状花のみで舌状花はまれ。開花は春が多いが通年見られる。
- ・草丈は20~40cm。



一般
外来種

キクイモ

キク科
多年草

- ・ヨーロッパ原産
- ・道端や荒地、農地に多い。
- ・葉は長楕円形で粗い鋸歯があり下方の葉は対性、上方の葉は互生する。
- ・先端に約8cmの頭花を付ける。舌状花は10~20枚で黄色。
- ・草丈は100~200cm、花期は9~10月。



一般
外来種

ワルナスビ

ナス科
多年草

- ・北アメリカ原産
- ・畑地や荒地に多い。
- ・茎は直立、節ごとにくの字型に曲がる。
- ・茎と葉裏の脈には鋭いトゲがある。
- ・花は径約2cmで淡紫色または白色。
- ・果実は径10~15mmの球状、黄色。
- ・草丈は40~80cm、花期は6~10月。



一般
外来種

マメグンバイナズナ

アブラナ科
多年草

- ・北アメリカ原産
- ・茎葉は互生し葉柄は無く不規則な粗い鋸歯があり長楕円形。
- ・花は径約3mm、白色の4花弁。
- ・果実は長さ約3mmの円形で2室に分かれ、1室に1個の種子がある。
- ・草丈は20~50cm、花期は5~6月。



一般
外来種

ヘラオオバコ

オオバコ科
2年草

- ・ヨーロッパ原産
- ・葉は全て根生で細長いへら状、長さ10~20cm、幅約2cm。
- ・株の中心から花茎が伸び長さ3~4cmの花穂をつける。花は白色。
- ・白い輪のような目立つおしべがある。
- ・草丈は20~70cm、花期は6~7月。